

New epothilone derivatives useful as pharmaceuticals and in plant protection

Patent number: DE19820599
Publication date: 1999-11-11
Inventor: HOEFLE GERHARD (DE); LEIBOLD THOMAS (DE)
Applicant: BIOTECHNOLOG FORSCHUNG GMBH (DE)
Classification:
- international: **C07D493/04; C07D493/00;** (IPC1-7): C07D493/08;
A01N43/90; A61K31/425
- european: C07D493/04
Application number: DE19981020599 19980508
Priority number(s): DE19981020599 19980508

Also published as:



WO9958534 (A3)
WO9958534 (A2)
EP1077980 (A3)
EP1077980 (A2)
US6982280 (B1)

more >>

Report a data error here

Abstract of DE19820599

Substituted epothilone derivatives (I) are new. Epothilone derivatives of formula (I) are new: A = group of formula (a) and R = protecting group (compound Ia); or A = group of formula (b) and R = protecting group (compound Ib); or A = group of formula (c) and R = protecting group (compound Ic); or A = group of formula (d) and R = protecting group (compound Id'); or A = group (d) and R = H (compound Id''); Hal = halogen e.g. Br or I; R<1> = H or 1-8C alkyl; X-Y = -CH₂CH-OPg or -CH=CH-; Pg = protecting group; R<2> = vinyl, monocyclic aryl or 5-6 membered heteroaryl (containing O, N and/or S atom(s)) and all optionally substituted with OR<4>, NR<5>R<6>, alkyl, alkenyl and/or alkynyl; and the vinyl and aryl are also optionally substituted by halo; R<4>, R<5> and R<6> = as for R<1>. Independent claims are also included for the preparation of compounds (Ia), (Ib), (Ic), (Id') and (Id'').

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 198 20 599 A 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
C 07 D 493/08
A 61 K 31/425
A 01 N 43/90

②① Aktenzeichen: 198 20 599.6
②② Anmeldetag: 8. 5. 98
②③ Offenlegungstag: 11. 11. 99

DE 198 20 599 A 1

⑦① Anmelder:
Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH
(GBF), 38124 Braunschweig, DE

⑦④ Vertreter:
Patentanwälte Dr. Boeters, Bauer, Dr. Forstmeyer,
81541 München

⑦② Erfinder:
Höfle, Gerhard, Prof. Dr., 38124 Braunschweig, DE;
Leibold, Thomas, Dr., 38124 Braunschweig, DE





Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen


- ⑤④ Epothilonderivate, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung
⑤⑦ Die vorliegende Erfindung betrifft Epothilonderivate,
Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung
zur Herstellung von Arzneimitteln und Pflanzenschutzmit-
teln.

DE 198 20 599 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Epithilonderivate, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln und Pflanzenschutzmitteln. Insbesondere betrifft die Erfindung Epithilonderivate der nachfolgend dargestellten allgemeinen Formeln 2 bis 6 sowie deren Verwendung als Arzneimitteln und Pflanzenschutzmittel.





In den vorstehenden Formeln bedeutet:

R^1 = ein H-Atom oder eine C_1 - bis C_8 -Alkylgruppe, vorzugsweise eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe, besonders bevorzugt eine C_1 - bis C_4 -Alkylgruppe, insbesondere eine Methyl-, Äthyl-, Propyl- oder Butylgruppe, 15

R^2 = ein monocyclischer Aromat, wie ein 5- oder 6-gliedriger Aromat (wie ein Phenylring) oder eine Vinylgruppe, die durch ein, zwei, drei, vier oder fünf, insbesondere ein oder zwei Halogenatome und/oder OR^4 - und/oder NR^5R^6 -Gruppen und/oder Alkyl- und/oder Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen in ortho- und/oder meta- und/oder para-Stellung substituiert sein können, worin R^4 , R^5 und R^6 unabhängig voneinander dieselbe Bedeutung wie R^1 haben, aber von R^1 unabhängig 20

sind, oder
 R^2 = ein monocyclischer 5- oder 6-gliedriger Heteroaromat, der eines oder mehrere, insbesondere ein oder zwei O- und/oder N- und/oder S-Atome im Ring aufweisen kann und/oder OR^4 - und/oder NR^5R^6 -Gruppen und/oder Alkyl- und/oder Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen als Substituenten aufweisen kann, worin R^4 , R^5 und R^6 wie vorstehend definiert sind. Insbesondere werden bei der Definition von R^2 C_1 - C_6 Alkyl-, bzw. C_2 - C_6 Alkenyl- und Alkynylgruppen, insbesondere 25 C_1 - C_4 Alkyl-, bzw. C_2 - C_4 Alkenyl- und Alkynylgruppen bevorzugt. Als Alkylgruppen werden besonders Methyl-, Äthyl-, Propyl- und Butylgruppen und als Heteroaromaten 6-gliedrige Heteroaromaten bevorzugt,


Hal ein Halogenatom wie Br oder I,

$X-Y$ = eine Gruppe der Formel $-CH_2CH-OP$ oder $-CH=CH-$, und

P = eine Schutzgruppe wie TMS.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können wie folgt hergestellt werden:

Verbindungen der Formel (2) können dadurch hergestellt werden, daß Verbindungen der Formel (1) 30



wie in der DE 195 42 986 beschrieben, umgesetzt werden, wobei die Reste wie vorstehend definiert sind. Insbesondere 45 können dabei die folgenden Bedingungen (i), (iii) und gegebenenfalls (nach (i)) auch (ii) eingesetzt werden:

- (i)
 - (a) O_3 in einem Lösungsmittel wie CH_2Cl_2 , und
 - (b) reduktive Aufarbeitung, z. B. mit Me_2S ; 50
- (ii)
 - (a) $(CH_3CO)_2O$, HCO_2H , NEt_3 , DMAP;
 - (b) DBU; und
 - (c) $MeOH$, NH_3 ; und
- (iii) Me_3SiCl , NEt_3 . 55

Verbindungen der Formel (3) sind dadurch zugänglich, daß eine Verbindung der Formel (2) mit einer Verbindung der Formel $ICl_3B(OR)_2$, wie Tris(äthylendioxyboryl)methan, umgesetzt wird. Dabei kann R eine wie vorstehend definierte Alkyl- oder Alkenylgruppe sein.


Bei der Umsetzung kommt gegebenenfalls eine starke Base, wie eine C_1 - C_4 -Alkyl-Li-Verbindung (wie Butyllithium) oder eine Di- C_1 - C_4 -alkylamin-Li-Verbindung (wie eine Dimethylaminlithiumverbindung) zum Einsatz. Die Umsetzung wird in der Regel bei tiefen Temperaturen wie z. B. bei Temperaturen von weniger als von $-30^\circ C$, vorzugsweise bei Temperaturen von weniger als $-50^\circ C$, besonders bevorzugt bei Temperaturen von mindestens $-78^\circ C$ durchgeführt. Weitere Reaktionsbedingungen können D. Schummer, G. Höll in Tetrahedron 1995, 51, 11219 entnommen werden.

Beispielsweise wird eine Verbindung der Formel (2) mit Tris(äthylendioxyboryl)methan und Butyllithium bei $-78^\circ C$ zu einer Verbindung der Formel (3) umgesetzt.

Aus einer Verbindung der Formel (3) kann durch Umsetzung mit N-Jod- oder N-Bromsuccinimid, gegebenenfalls in einem polaren Lösungsmittel, wie Acetonitril, eine Verbindung der Formel (4) hergestellt werden. Weitere Reaktionsbe-

dingungen können der folgenden Literaturstelle entnommen werden: N. A. Petasis, I. A. Zavialor, *Tetrahedron Lett.* 1996, 37, 567.


- Zur Herstellung einer Verbindung der Formel (5) kann eine Verbindung der Formel (3) im Rahmen einer Suzuki-Kopplung mit einer Verbindung der Formel R^2-Z umgesetzt werden, wobei R^2 die vorstehend angegebenen Bedeutungen hat und Z ein Halogenatom oder eine Gruppe der Formel $-OSO_2Cl_3$, $-CH=CH$, $-CH=CHOSO_2Cl_3$ sein kann. Insbesondere kann die Gruppe R^2-Z die folgenden Strukturen aufweisen:



- 15 worin A^1 O, S, N oder C-Atome darstellt und die Substituenten O-, N- und C- den vorstehend beschriebenen Gruppen OR^4 , NR^5R^6 , und Alkyl-, Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen entsprechen.

Insbesondere werden C_1 - C_6 Alkyl-, bzw. C_2 - C_4 Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen, insbesondere O_1 - C_4 Alkyl-, bzw. C_2 - C_4 Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen als Substituenten "C" bevorzugt. Als Alkylgruppen werden besonders Methyl-, Ethyl-, Propyl- und Butylgruppen bevorzugt.

- 20 Alternativ kann eine Verbindung der Formel (5), dadurch hergestellt werden, daß eine Verbindung der Formel (4) durch eine Stille-Kupplung mit R^2-SnR^3 umgesetzt wird, wobei R^2 wie vorstehend definiert ist und R^3 eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe, vorzugsweise eine C_1 - bis C_4 -Alkylgruppe und besonders bevorzugt eine Methyl-, Ethyl-, Propyl- oder Butylgruppe ist. Außerdem kann die Verbindung R^2-SnR^3 eine der folgenden Strukturen aufweisen:



worin die Reste und Substituenten wie vorstehend definiert sind.

- Erfindungsgemäß kann weiter eine Verbindung der Formel (6), dadurch hergestellt werden, daß von der Verbindung der Formel (5) die Schutzgruppe z. B. mit einer schwachen Säure, wie Zitronensäure oder Verbindungen wie TBAF, Pyridin x HF, entfernt wird. Gegebenenfalls kann dabei als Lösungsmittel ein Alkohol, wie Methanol, eingesetzt werden, wobei die Temperatur vorzugsweise auf Werte von z. B. 40 bis 60°C, bevorzugt etwa 50°C, eingestellt wird.

Insgesamt kann die Verbindung der Formel (6) durch die vorstehend beschriebenen Schritte (Epothilon A oder B \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (5) \rightarrow (6) oder Epothilon A oder B (2) \rightarrow (3) \rightarrow (5) \rightarrow (6)) hergestellt werden.

- Weiter werden erfindungsgemäß Arzneimittel offenbart, die mindestens eine der Verbindungen (2), (3), (4), (5) oder (6) und gegebenenfalls übliche Träger, Verdünnungsmittel und Adjuvantien enthalten.

Insbesondere können derartige Verbindungen auch als Cytostatica und für den Pflanzenschutz in der Landwirtschaft und/oder Forstwirtschaft und/oder im Gartenbau eingesetzt werden, wobei sie gegebenenfalls zusammen mit einem oder mehreren üblichen Trägern, Adjuvantien und/oder Verdünnungsmitteln verwendet werden.

Beispiele

Synthese der Ketonderivate 2

Detaillierte Beschreibung siehe DE 195 42 986 A1.

Synthese der Alkenylboronsäurederivate 3

(s. auch D. Schummer, G. Höfle *Tetrahedron* 1995, 51, 11219)

Typisches Beispiel ($R^1 = H$, $X-Y = CH_2CHOTMS$):

- 55 Tris(ethyldioxyboryl)methan (0,30 g, 1,5 mmol) wurde in CH_2Cl_2 /THF (1 : 1; 4 ml) gelöst vorgelegt und unter Inertgas auf $-78^\circ C$ gekühlt. Bei dieser Temperatur wurde innerhalb von 10 min Butyllithium (1,6 M-Lsg in Hexan; 0,73 ml, 1,2 mmol) zugegeben. Nach 2 h wurde Keton 2 (81 mg, 0,15 mmol) in CH_2Cl_2 /THF (1 : 1; 2 ml) zugegeben, auf Raumtemperatur erwärmt und 17 h lang gerührt. Nach Versetzen mit MeOH (2 ml) wurde die klare Reaktionslösung mittels präparativer HPLC (Lichroprep RP-18, CH_3CN/H_2O 75 : 25) gereinigt. Es wurden 57 mg (65%) Alkenylboronsäure 3 als E/Z-Isomerengemisch (6 : 4) erhalten.

- 60 Ausgewählte typische Daten: LC-MS (ESI-MS): 585 ($M^+ + H$); 1H -NMR: (300 MHz, CD_3OD): E-Isomer: 1,91 (s, 3 H), 5,16 (d, 1 H, 10 Hz), 5,49 (s, 1 H), Z-Isomer: 1,85 (d, 3 H, 1,1 Hz), 4,93 (s, 1 H), 5,26 (d, 1 H, 9,6 Hz).

Synthese der Iodvinyl derivative 4

(s. auch N. A. Petasis, I. A. Zavialor, *Tetrahedron Lett.* 1996, 37, 567).

Typisches Beispiel ($R^1 = H$, $X-Y = CH_2CHOTMS$):

Bei Raumtemperatur wurde eine Lösung von Alkenylboronsäure 3 (12 mg, 21 μ mol; E/Z 9 : 1) in CH_3CN (150 μ l) unter

Inertgas und Lichtausschluß mit N-Iodsuccinimid (6,0 mg, 27 μ mol) versetzt und 3 h gerührt. Nach Fällungen wurde der Rückstand mittels präparativer Dünnschichtchromatographie (SiO_2 , $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{MeOH}$ 95 : 5) gereinigt. Es wurden 9 mg (66%) des Iodvinyl-Derivats 4 als E/Z-Isomerengemisch (9 : 1) isoliert.

Ausgewählte typische Daten: LC-MS (ESI-MS): 667 ($\text{M}^+ + \text{H}$); ^1H -NMR: (300 MHz, CDCl_3): E-Isomer: 1,82 (d, 3 H, 1,1 Hz), 5,36 (d, 1 H, 11 Hz), 6,43 (s, 1 H), Z-Isomer: 1,84 (d, 3 H, 1,1 Hz), 5,54 (d, 1 H, 10,5 Hz), 6,09 (s, 1 H).

Suzuki-Kupplung der Alkenylboronsäure 3

(s. auch A. Suzuki, Acc. Chem. Res. 1982, 15, 178; A. Torrado, S. Lopez, R. Alvarez, A. R. De Lera Synthesis, 1995, 285).

Typisches Beispiel ($\text{R}^1 = \text{H}$, $\text{X}-\text{Y} = \text{CH}_2\text{CH}(\text{OTMS})$, $\text{R}^2 = \text{Ph}$):

Eine Lösung von Alkenylboronsäure 3 (12 mg, 21 μ mol; E/Z 2 : 8) und Thalliummethanolat (2M-Lsg in EtOH; 12 μ l, 24 μ mol) in THF (150 μ l) wurde 15 min bei Raumtemperatur gerührt, dann eine Lösung von Phenyloxidid (4,0 μ l, 6,0 mg, 29 μ mol) und Tetrakis(triphenylphosphino)palladium (7,1 mg, 6,2 μ mol) in THF (150 μ l) in 30 min zugetropft und erneut 30 min gerührt. Nach Reinigung mittels präparativer Dünnschichtchromatographie (SiO_2 , $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{Et}_2\text{O}$ 95 : 5) wurde das phenylanaloge Epothilon 5 (10 mg, 79%, E/Z 2 : 8) als farbloser Feststoff erhalten.


Ausgewählte typische Daten: LC-MS (ESI-MS): 617 ($\text{M}^+ + \text{H}$); ^1H -NMR: (300 MHz, CDCl_3): E-Isomer: 1,87 (d, 3 H, 1,4 Hz), 5,35 (d, 1 H, 10,7 Hz), 6,54 (s, 1 H), Z-Isomer: 1,80 (d, 3 H, 1,5 Hz), 5,61 (d, 1 H, 10,2 Hz), 6,41 (s, 1 H).

Stille-Kupplung der Iodvinyllderivate 4

(s. auch K. C. Nicolaou, Y. He, F. Roschangar, N. P. King, D. Vourloumis, T. Li Angew. Chem. 1998, 110, (1/2), 89).


Patentansprüche

1. Epothilonderivat der Formel (2)




worin R^1 ein H-Atom oder eine C_1 - bis C_8 -Alkylgruppe, $\text{X}-\text{Y}$ eine Gruppe der Formel $-\text{CH}_2\text{CH}-\text{OP}$ oder $-\text{CH}=\text{CH}-$, und P eine Schutzgruppe ist.

2. Epothilonderivat der Formel (3)




worin die Reste wie in Anspruch 1 definiert sind.


3. Epothilonderivat der Formel (4)



worin die Reste R^1 , X-Y und P wie in Anspruch 1 definiert sind, und Hal ein Halogenatom wie Br oder J ist.
4. Epothilonderivat der Formel (5)



worin die Reste R^1 , X-Y und P wie in Anspruch 1 definiert sind und
 R^2 ein monocyclischer Aromat oder eine Vinylgruppe ist, die durch Halogenatome und/oder OR^4 - und/oder NR^5R^6 - und/oder Alkyl-, Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen in ortho- und/oder meta- und/oder para-Stellung substituiert sein können, oder ein monocyclischer 5- oder 6-gliedriger Heteraromat ist, der eines oder mehrere O- und/oder N- und/oder S-Atome im Ring aufweisen kann und/oder OR^4 - und/oder NR^5R^6 - und/oder Alkyl-, Alkenyl- und/oder Alkynylgruppen als Substituenten aufweisen kann, wobei die Reste R^4 , R^5 und R^6 unabhängig voneinander wie R^1 in Anspruch 1 definiert sind, aber von R^1 unabhängig sind.
5. Epothilonderivat der Formel (6)



worin die Reste wie in Anspruch 4 definiert sind.

6. Epothilonderivat nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß R^1 , R^4 , R^5 und R^6 ein H-Atom oder eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe, vorzugsweise eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe ist.

7. Epothilonderivat nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Substituenten des monocyclischen Aromaten und/oder Heteroaromaten C_{1-6} -Alkyl- bzw. C_{2-6} -Alkenyl bzw. C_{2-6} -Alkynylgruppen, vorzugsweise C_{1-4} -Alkyl- bzw. C_{2-4} -Alkenyl bzw. C_{2-4} -Alkynylgruppen sind und die Halogenatome Fluor-, Chlor-, Brom- oder Jodatome sind.

8. Epothilonderivat nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Aromat bzw. Heteroaromat 1, 2 oder 3 Substituenten und der Heteroaromat 1, 2 oder Heteroatome aufweist.

9. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel (3), dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel (2) mit einer Verbindung der Formel $HC[IB(OR)_2]_3$ umgesetzt wird, wobei die Reste wie in einem der vorstehenden Ansprüche definiert sind und R wie R^1 definiert aber von R^1 unabhängig ist.

10. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel (4), dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel (3) mit N-Iod- oder N-Bromsuccinimid umgesetzt wird und die Reste wie in einem der vorstehenden Ansprüche definiert sind.

11. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel (5), dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel (3) durch eine Suzuki-Kopplung mit einer Verbindung der Formel R^2-Z umgesetzt wird, wobei R^2 wie in einem der vorstehenden Ansprüche definiert ist und Z ein Halogenatom oder eine Gruppe der Formel $-OSO_2CF_3$, $-CH=CH-$, $-CH=CHOSO_2CF_3$ sein kann.

12. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel (5), dadurch gekennzeichnet, daß eine Verbindung der Formel (4) durch eine Stille-Kupplung mit R^2-SnR^3 umgesetzt wird, wobei R^2 wie in einem der vorstehenden Ansprüche definiert ist und R^3 eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe, vorzugsweise eine C_{1-4} -Alkylgruppe, besonders bevorzugt eine Methyl-, Ethyl-, Propyl- oder Butylgruppe ist.

13. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel (6), dadurch gekennzeichnet, daß von einer Verbindung der Formel (5) die Schutzgruppe entfernt wird.

14. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel (6), dadurch gekennzeichnet, daß es die Verfahrensstufen umfaßt, die in den Ansprüchen 9, 10, 11 oder 12 und 13 offenbart sind, wobei die Reste wie in den vorstehenden Ansprüchen definiert sind.

15. Arzneimittel, das mindestens eine der in den Ansprüchen 1 bis 8 beschriebenen Verbindungen und gegebenenfalls übliche Träger, Verdünnungsmittel und/oder Adjuvantien enthält.

16. Arzneimittel nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um ein Cytostaticum handelt.

17. Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft und/oder Forstwirtschaft und/oder im Gartenbau, das mindestens eine der in den Ansprüchen 1 bis 8 beschriebenen Verbindungen und gegebenenfalls übliche Träger, Verdünnungsmittel und/oder Adjuvantien enthält.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.